

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Thuốc thử xét nghiệm định lượng: HbA1c 2R CON L

Chỉ dẫn / mục đích sử dụng:	- Là một bộ bốn mẫu chứng đông khô dựa trên nguyên liệu máu hu-man (hồng cầu). Nồng độ HbA1c trong HbA1c 2R CON L là bình thường.; - Hóa chất sử dụng trên các loại máy xét nghiệm sinh hóa;
Tóm tắt và nguyên lý:	Sản phẩm được thiết kế để phục vụ như là một chức năng tương đương với máy có sẵn được phân phối bởi nhà sản xuất: Erba Lachema/CH Séc
Thành phần:	(Xem tờ quy trình kỹ thuật được đóng gói đi kèm cùng với sản phẩm)
Phạm vi xác định:	Xuất hiện rõ ràng, không có bụi hạt nhìn thấy được
Hóa chất chỉ được dùng cho chẩn đoán in vitro (IVD)	
Phân định giá trị:	(Xem tờ quy trình kỹ thuật được đóng gói đi kèm cùng với sản phẩm)
Chuẩn bị hóa chất:	Hóa chất đã sẵn sàng để sử dụng
Cảnh báo và thận trọng:	- Chỉ dùng cho phòng xét nghiệm chẩn đoán. - Chỉ dùng cho hệ thống máy phân tích sinh hóa. - Không được uống, bảo quản lạnh 2-8°C. - Tuân thủ quy trình thực hành tốt phòng xét nghiệm (Good Laboratory Practices – GLP) khi xử lý sản phẩm.
Độ ổn định và bảo quản:	- Hóa chất (khi chưa mở nắp) có độ ổn định trong thời hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm khi bảo quản ở 2-8°C. - Hóa chất (khi mở nắp) có độ ổn định trong thời gian 30 ngày khi bảo quản ở 2-8°C.
Mẫu thử:	Huyết thanh, huyết tương của người
Hướng dẫn sử dụng:	Có kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng trong các hộp hóa chất. Cài đặt tham số xét nghiệm theo máy phân tích sinh hóa
Xử lý chất thải:	- Sản phẩm này được làm để sử dụng trong các phòng thí nghiệm chuyên nghiệp (Vui lòng tham khảo các quy định của địa phương về việc xử lý chất thải) - Sử dụng thùng chứa chất thải thích hợp để trách ô nhiễm môi trường. - Tránh vứt bỏ sản phẩm ra môi trường (Tham khảo bảng dữ liệu an toàn – MSDS).

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ
GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Thành