



LƯU Ý: - Người quá mẫn cảm với bất kì thành phần của sản phẩm.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
 Hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng có ghi trên bao bì.

Tiêu chuẩn: TCCS
 Số tiếp nhận/ Reg.No:

Thương nhân đăng ký và đưa sản phẩm ra thị trường:
CÔNG TY TNHH TM - XNK NOVA PHARMA - C.T.K
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 31 liên kế 23, khu đô thị Văn Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 Website: novaminvietnam.com

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHABIGROUP**
Địa chỉ: Lô 16-17-18 đường Nguyễn Như Quế, TDP Văn Quan, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

15 ml

HỊT HỌNG
FITO-IRON Junior

Fe (III) hydroxyde polymaltose complex



150 lần xịt

THÀNH PHẦN

Fe (III) hydroxyde polymaltose complex: 495mg (Nhập Khẩu Ý)
 Inulin: 375mg
 Đường; Kali sorbate; Hương dứa; Nước tinh khiết vừa đủ 15ml

1 LẦN HỊT

1mg nguyên tố sắt tương đương 3,3 mg Fe III ; 2,5mg Inulin

CÔNG DỤNG

Hỗ trợ bổ sung sắt cho cơ thể, giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Sản phẩm có bổ sung thêm chất sơ không gây táo bón cho người dùng.

ĐỐI TƯỢNG

Trẻ em từ 3 tháng - 1 tuổi ngày xịt 2-3 lần
 Trẻ từ 1 tuổi đến 3 tuổi ngày xịt 3-4 lần

15 ml

HỊT HỌNG
FITO-IRON Junior

Fe (III) hydroxyde polymaltose complex



150 lần xịt

CÁCH DÙNG

Lắc kỹ lọ trước khi sử dụng. Dùng xịt trực tiếp vào khoang miệng. Sử dụng sản phẩm trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 2 tiếng.

Đối với trẻ sinh đủ tháng sử dụng cân 1mg sắt nguyên tố/ 1kg/ ngày - 1 lần xịt/ ngày

Đối với trẻ sinh non thiếu tháng: - Cân nặng dưới 1kg bổ sung 4mg sắt nguyên tố/ ngày-4 lần xịt/ ngày

- Cân nặng 1-1,5kg bổ sung 3mg sắt nguyên tố/ ngày-3 lần xịt/ ngày

- Cân nặng 1,5- 2kg bổ sung 2mg sắt/ ngày- 2 lần xịt/ngày



Hỗ trợ bổ sung sắt cho cơ thể, giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

Fe (III) hydroxyde polymaltose complex
 Nhập Khẩu Ý



Số lô :
 NSX :
 HSD :



Hỗ trợ bổ sung sắt cho cơ thể, giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

Fe (III) hydroxyde polymaltose complex
 Nhập Khẩu Ý



LƯU Ý: - Người quá mẫn cảm với bất kì thành phần của sản phẩm.
 - Sản phẩm chỉ dùng ngoài, không được uống. Để xa tầm tay trẻ em.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
 Hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng có ghi trên bao bì.

Thương nhân đăng ký và đưa sản phẩm ra thị trường:
CÔNG TY TNHH TM - XNK NOVA PHARMA - C.T.K
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 31 liên kế 23, khu đô thị Văn Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHABIGROUP
Địa chỉ: Lô 16-17-18 đường Nguyễn Như Quế, TDP Văn Quan, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Tiêu chuẩn: TCCS
 Số tiếp nhận/ Reg.No:

Số lô :
 NSX :
 HSD :

Nova Pharma
HỊT HỌNG
FITO-IRON Junior

Fe (III) hydroxyde polymaltose complex

Hỗ trợ bổ sung sắt cho cơ thể, giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

15 ml



THÀNH PHẦN: Fe (III) hydroxyde polymaltose complex.....495mg (Nhập Khẩu Ý)
 Inulin.....375mg
 Đường; Kali sorbate; Hương dứa; Nước tinh khiết vừa đủ 15ml

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ bổ sung sắt cho cơ thể, giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Sản phẩm có bổ sung thêm chất sơ không gây táo bón cho người dùng.

ĐỐI TƯỢNG: Trẻ em từ 3 tháng - 1 tuổi ngày xịt 2-3 lần
 Trẻ từ 1 tuổi đến 3 tuổi ngày xịt 3-4 lần

CÁCH DÙNG:Lắc kỹ lọ trước khi sử dụng. Dùng xịt trực tiếp vào khoang miệng. Sử dụng sản phẩm trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 2 tiếng.

Đối với trẻ sinh đủ tháng sử dụng cân 1mg sắt nguyên tố/ 1kg/ ngày - 1 lần xịt/ ngày

Đối với trẻ sinh non thiếu tháng:- Cân nặng dưới 1kg bổ sung 4mg sắt nguyên tố/ ngày-4 lần xịt/ ngày
 - Cân nặng 1-1,5kg bổ sung 3mg sắt nguyên tố/ ngày-3 lần xịt/ ngày
 - Cân nặng 1,5- 2kg bổ sung 2mg sắt/ ngày- 2 lần xịt/ngày