

80 X 30 MM

THÀNH PHẦN:
Povidone - Iodine 2g
tá được vừa đủ 20ml

CHỈ ĐỊNH:

- Sát khuẩn vết thương, sát khuẩn da.
- Vệ sinh dụng cụ y tế trước khi tiệt trùng.
- Súc miệng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người có tiền sử quá mẫn cảm với iod
- Trẻ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ sơ sinh.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

THẬN TRỌNG:

- Nếu dùng lặp lại và kéo dài có thể bị quá tải iod dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp.
- Cần thận trọng khi sử dụng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận.

POVIDONE - IODINE 10%

Dung dịch sát khuẩn

**20ml
không được uống**

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Sát khuẩn vết thương, sát khuẩn da: tẩm chế phẩm vào bông sạch bôi lên vùng da trước khi tiêm hay truyền.
- Vệ sinh dụng cụ y tế: Pha loãng chế phẩm với nước sạch theo tỷ lệ (1:1) ngâm dụng cụ trong 30 phút. Sau đó vết dụng cụ rửa bằng nước sạch, lau khô đem tiệt trùng.
- Súc miệng: Pha loãng chế phẩm với nước sạch theo tỷ lệ (1:2) để súc miệng.

TIÊU CHUẨN: TCCS: 006: 2018/ NP

LSX:

NSX:

HSD:

Sản xuất bởi:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT
Trụ sở: 30/269 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, TP Nam Định
Nhà máy sản xuất: Lô 57, Đường N3, Cụm CN An Xá, TP Nam Định
Đc: 0228. 6517 998 / 0932 346 255

POVIDONE - IODINE 10%

**20ml
không được uống**

80 x 30 x 30 mm

POVIDONE - IODINE 10%

Dung dịch sát khuẩn

**20ml
không được uống**

POVIDONE - IODINE 10%

**20ml
không được uống**

THÀNH PHẦN:
Povidone - Iodine 2g
tá được vừa đủ 20ml

CHỈ ĐỊNH:

- Sát khuẩn vết thương, sát khuẩn da.
- Vệ sinh dụng cụ y tế trước khi tiệt trùng.
- Súc miệng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người có tiền sử quá mẫn cảm với iod
- Trẻ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ sơ sinh.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

THẬN TRỌNG:

- Nếu dùng lặp lại và kéo dài có thể bị quá tải iod dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp.
- Cần thận trọng khi sử dụng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Sát khuẩn vết thương, sát khuẩn da: tẩm chế phẩm vào bông sạch bôi lên vùng da trước khi tiêm hay truyền.
- Vệ sinh dụng cụ y tế: Pha loãng chế phẩm với nước sạch theo tỷ lệ (1:1) ngâm dụng cụ trong 30 phút. Sau đó vết dụng cụ rửa bằng nước sạch, lau khô đem tiệt trùng.
- Súc miệng: Pha loãng chế phẩm với nước sạch theo tỷ lệ (1:2) để súc miệng.

TIÊU CHUẨN: TCCS: 006: 2018/ NP

LSX:

NSX:

HSD:

Sản xuất bởi:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT
Trụ sở: 30/269 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, TP Nam Định
Nhà máy sản xuất: Lô 57, Đường N3, Cụm CN An Xá, TP Nam Định
Đc: 0228. 6517 998 / 0932 346 255

Dung dịch sát khuẩn

POVIDONE - IODINE 10%

**20ml
không được uống**



NAM PHAT PHARM

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT

Trụ sở: 30/269 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, TP Nam Định
Nhà máy sản xuất: Lô 57, Đường N3, Cụm CN An Xá, TP Nam Định

Đc: 0228. 6517 998 / 0932 346 255

BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Đậy nắp ngay sau khi sử dụng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

TIÊU CHUẨN: TCCS: 006: 2018/ NP

Lô Sx:

Ngày Sx:

HSD:

POVIDONE - IODINE 10%