

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Gel giảm đau ProZero Pain Relieving Gel with Arnica

Công ty Cổ phần Cầu nối Việt Mỹ

Phòng 902, Số 185 Đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Ngày 30 tháng 11 năm 2018

- Rửa sạch và làm khô vùng da bị đau trước khi dùng gel.
- Dùng một lượng gel vừa đủ để xoa bóp.
- Mỗi ngày có thể dùng từ 1 đến 4 lần tùy vào vị trí.
- Nếu gel tràn ra ngoài vùng da bị đau có thể dùng bông thấm, lau sạch.
- Sau khi sử dụng thì cần đậy nắp kín ngay và bảo quản ở nhiệt độ phòng và tránh xa các nguồn nhiệt cao để dùng tiếp cho những lần sau.
- Không bôi lên mắt hoặc tại các vùng da dễ bị kích ứng, nếu trường hợp này xảy ra thì rửa dưới vòi nước sạch liên tục ít nhất 15 phút.
- Sau khi sử dụng phải rửa sạch tay ngay, nhất là trước ăn uống hoặc hút thuốc
- Không ăn hoặc ngủ.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.
- Không nên sử dụng sau khi đã mở nắp được 18 tháng.
- Chỉ sử dụng đúng mục đích của sản phẩm, không được dùng với bất kỳ mục đích nào khác.
- Chỉ sử dụng với người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, trẻ em dưới 12 tuổi cần được sự cho phép của bác sĩ.
- Nếu có bất kỳ phản ứng phụ nào hãy hỏi bác sĩ để được tư vấn.

Đại diện hợp pháp của công ty



GIÁM ĐỐC

Huỳnh Mỹ Vy